

FUNCIONARIOS DE LA SALUD ENFOCAN SUS ESFUERZOS EN LA VACUNACION DE GRUPOS MINORITARIOS

Grupos Minoritarios Son 2-3 veces Más Susceptibles a Ser Hospitalizados con H1N1

MADISON – El Wisconsin Department of Health Services (DHS) lanzó la Semana Nacional de Vacunación Contra la Influenza/Gripe esta semana exhortando a los departamentos de salud locales a aumentar sus esfuerzos de vacunación H1N1 en comunidades minoritarias. DHS promulgó un informe mostrando que el número de casos requiriendo hospitalización debido al H1N1 fue más elevado para poblaciones minoritarias durante el brote ocurrido en el otoño del 2009.

"Basado en estos números es claro que además de éstos con condiciones fundamentales de salud, grupos minoritarios deben ser considerados una prioridad para esfuerzos de vacunación en 2010," dijo el Dr. Seth Foldy, Oficial de Salud del Estado. "Hay muchos factores que juegan en esta tendencia, la cual existe en varias comunidades en nuestro estado. Esto quiere decir que debemos utilizar muchos enfoques diferentes para tratar y proteger estas comunidades antes de una posible tercer onda de influenza".

En Wisconsin, en el otoño las hospitalizaciones debido a H1N1 por cada 100.000 miembros de la población fueron 40.2 para afroamericanos comparado con 13.0 para caucásicos no de origen hispano; 3.1 veces más. Disparidades semejantes existieron para indios americanos, los cuales fueron 3.4 veces más probables de ser hospitalizados; hispanos, que fueron 2.6 veces más probables de ser hospitalizado; y asiáticos, que fueron 2.1 veces más probables en comparación a personas caucásicas.

Algunas explicaciones para esta variaciones en las tasas de hospitalización incluyen:

- Las poblaciones afroamericanas e hispanas de Wisconsin son más jóvenes, en general, que caucásicos no de origen hispano, con niños y adultos más jóvenes quienes experimentan las tasas más altas de la infección H1N1.
- Las poblaciones minoritarias de Wisconsin a menudo tienen tasas más altas de diabetes, asma, enfermedades cardíacas, y otras condiciones que son factores de riesgo para la influenza severa, las cuales podría aumentar su riesgo de hospitalización debido a la infección H1N1.
- Las poblaciones minoritarias de Wisconsin pueden tener menor acceso a asistencia para el cuidado de la salud en términos generales, lo cual puede resultar en el uso reducido de la terapia preventiva antiviral o en el esperar hasta que los pacientes estén más enfermos antes de ver a un proveedor médico.
- Tasas históricas de vacunación más reducidas significa que poblaciones minoritarias son menos probables de buscar y recibir vacunas.

DHS ha estado promoviendo la vacuna H1N1 entre las poblaciones afroamericanas, hispanas y hmong por medio de anuncios en la radio en el idioma inglés e idiomas extranjeros. Publicidad adicional ha sido añadida recientemente a programas de radio de indios americanos y el Departamento actualmente está planeando una campaña adicional dirigida específicamente a poblaciones minoritarias.

Los detalles del informe, inclusive números específicos para algunos condados, pueden ser encontrados en: <http://www.flu.wisconsin.gov/mediaroom.asp?locid=106>